

IMAGENOLOGÍA	CODIGO: AS-IMG-GU-072
ASISTENCIAL	VERSION: 8
PREPARACIÓN TAC DE ABDOMEN CONTRASTADO NIÑOS	ACTUALIZACION: 17/08/2018

Señor usuario se le realizará un **TAC DE ABDOMEN CONTRASTADO**

POR FAVOR INFORME E INDIQUENOS PREVIAMENTE AL DESARROLLO DE ESTA PREPARACIÓN SI EL PACIENTE PRESENTA ALERGIAS CONOCIDAS AL YODO O MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS, COMIDA DE MAR O SUFRE DE ASMA.

Como requisito indispensable para asignar la cita del TAC debe presentar la PRUEBA DE CREATININA RECIENTE (no mayor a 15 días de tomada)

PREPARACIÓN

1. Traer el niño despierto y trasnochado de tal manera que se duerma profundamente para el examen y así evitar una anestesia y los riesgos que esta implica.
2. No haber ingerido ningún alimento seis (6) horas antes del procedimiento.
3. Se le entregara un frasco con medio de contraste oral Gastroview de 30 cc, el cual debe tomarse de la siguiente manera (se recomienda usar una jeringa de 10cc):
 - Según la edad del paciente, diluir el medio de contraste en agua como indica la siguiente tabla y repartir la dilución en 4 dosis.

Edad	Medio de contraste (cc)	Dilución (cc Agua)
0 a 6 meses	4	80
6 a 12 meses	8	180
1 a 5 años	15	270
6 a 9 años	20	360
Más de 10 años	30	500

- Seis (6) horas antes del examen se debe tomar una dosis cada hora hasta completar 3 dosis, y traer el sobrante al momento del examen. Si no lo trae se le cobrara el valor del frasco de medio de contraste.

Nota: No olvide traer la documentación completa (historia clínica, orden médica, autorizaciones y estudios anteriores)