

<b>IMAGENOLOGÍA</b>	<b>CODIGO: AS-IMG-GU-079</b>
<b>ASISTENCIAL</b>	<b>VERSION: 2</b>
<b>PREMEDICACION PARA PACIENTES ALÉRGICOS HOSPITALARIOS</b>	<b>ACTUALIZACION: 17/08/2018</b>

**Si el paciente tiene alergias conocidas al yodo o los medios de contraste yodados, a la comida de mar o es asmático tenga en cuenta la siguiente información antes de realizar procedimiento con medio de contraste:**

SI EL PACIENTE ES UN NIÑO < 12 años, LA DOSIS DE LOS MEDICAMENTOS DEBE SER ESTIPULADA POR EL MÉDICO TRATANTE.

#### **PREMEDICACION:**

1. Aplicar METILPREDNISOLONA 40mg intravenosa ò HIDROCORTISONA 200mg intravenosa cuatro (4) horas antes del estudio.
  2. Si el paciente es alérgico a la METILPREDNISOLONA, ASA O AINES, especialmente si es asmático, aplicar FOSFATO SODICO DE DEXAMETASONA 8mg intravenoso o BETAMETASONA 6mg intravenoso cuatro (4) horas antes de la realización del estudio.
  3. Aplicar CLORFERINAMINA 10mg intravenoso ò DIFENHIDRAMINA 50mg intravenoso, una (1) hora antes de la realización del estudio.
- En caso de urgencia vital que no se puedan esperar las cuatro (4) horas de preparación administrar CLORFERINAMINA 10mg intravenoso ò DIFENHIDRAMINA 50mg intravenoso, una hora antes de la realización del estudio